

# Teilbarkeit und Suspendierbarkeit

Stand Mai 2022

Präparat	Teilbar	Mörserbar	Suspendierbar	Hinweis
Abacavir/Lamivudin ratiopharm® 600 mg/300 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Acarbose-ratiopharm® 50 mg Tabletten	Nein	Ja	Ja	
ACE-Hemmer-ratiopharm® comp 50 mg/25 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Aciclovir-ratiopharm® Tabletten 200 mg; 400 mg; 800 mg	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Acimethin® 500 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	Tablette vor dem Suspendieren mörsern oder zerkleinern
Agomelatin-ratiopharm® 25 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Alendronsäure-ratiopharm® plus Alfacalcidol 70 mg Tabletten und 1 Mikrogramm Weichkapseln	Nein	Nein	Nein	Zusätzliche Information auf Nachfrage
Alendronsäure-ratiopharm® plus Colecalciferol 70 mg/5600 I.E. Tabletten	Nein	Nein	Nein	Zusätzliche Information auf Nachfrage
Alfacalcidol-ratiopharm® 0,25 µg; 1 µg Weichkapseln	Nein	Nein	Nein	
Alfuzosin-ratiopharm® uno 10 mg Retardtabletten	Nein	Nein	Nein	
Allopurinol-ratiopharm® 100 mg; 300 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Alprazolam-ratiopharm® Tabletten 0,25 mg; 0,5 mg; 1,0 mg	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Amantadin-ratiopharm® 100 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Ambrisentan-ratiopharm® 5 mg; 10 mg Filmtabletten	Nein	Nein	Nein	
Ambroxol-ratiopharm® 30 mg Hustenlöser Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Ambroxol-ratiopharm® 60 mg Hustenlöser Tabletten	Kreuzbruchkerbe	Ja	Ja	
Ambroxol-ratiopharm® 75 mg Hustenlöser Retardkapseln	Nein	Nein	Ja*	Keine Sondengabe möglich (Verklebungsgefahr)
Amilorid comp.-ratiopharm® 5 mg/50 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Amiodaron-ratiopharm® 100 mg; 200 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	Suspension frisch herstellen und zeitnah verwenden (lichtempfindlich!)
Amlodipin-ratiopharm® 5 mg N Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Amlodipin-ratiopharm® 10 mg N Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Amoxicillin-ratiopharm® Filmtabletten 500 mg; 750 mg; 1000 mg	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Amoxicillin-ratiopharm® comp. Filmtabletten 500 mg/125 mg; 875 mg/125 mg	Bruchkerbe (nur zur Einnahmeerleichterung, nicht zur Dosishalbtierung)	Ja	Ja	
Anagrelid-ratiopharm® 0,5 mg; 1 mg Hartkapseln	Nein	Nein	Ja**	**CMR Potential

## Suspendierbar

- Hierunter wird verstanden, dass die ungeteilte Arzneiform in kaltem Leitungswasser innerhalb einer gewissen Toleranzzeit zerfällt. Bei Kapseln bezieht sich die Angabe auf das Suspendieren des Kapselinhalts.
- „Ja“ Kapseln können geöffnet werden; Retardpellets / Mikrotabletten nicht zerkleinern, sonst wird die Formulierung zerstört!
- „Nein“ Suspendierung ist nicht möglich.
- Da keine Untersuchungen zur Stabilität vorliegen, sollte eine Applikation bei geteilten bzw. gemörserten Tabletten möglichst zeitnah ( $\leq \frac{1}{2}$  Std.) erfolgen; Gleiches gilt für Suspensionen durch aufgeschlammte Pulver.

Stand Mai 2022

Präparat	Teilbar	Mörserbar	Suspendierbar	Hinweis
Anastrozol-ratiopharm® 1 mg Filmtabletten	Nein	Ja**	Ja	**CMR Potential
Aprepitant-ratiopharm® 80 mg; 125 mg Hartkapseln Aprepitant-ratiopharm® 125 mg + 80 mg Hartkapseln	Nein	Nein	Ja	Mikropellets 0,8–1,2 mm Kapseln können geöffnet und die Mikropellets germörsert werden
Aripiprazol-ratiopharm 5 mg Tabletten	Nein	Ja	Ja	
Aripiprazol-ratiopharm Tabletten 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg,	Bruchkerbe	Ja	Ja	
ASS-ratiopharm® 100 mg magensaftresistente Tabletten	Nein	Nein	Nein	
ASS-ratiopharm® 300 mg; 500 mg Tabletten	Kreuzbruchkerbe	Ja	Ja	
ASS-ratiopharm® 100 mg TAH Tabletten	Kreuzbruchkerbe	Ja	Ja	
ASS + C-ratiopharm® gegen Schmerzen Brausetabletten	Nein	Ja	Ja	Sondengabe möglich nach Ende des Sprudelvorgangs
Atenolol-ratiopharm® Filmtabletten 25 mg; 50 mg; 100 mg	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Atenolol comp.-ratiopharm® Filmtabletten 100 mg/25 mg	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Atomoxetin-ratiopharm® Hartkapseln 10 mg; 18 mg; 25 mg; 40 mg; 60 mg; 80 mg; 100 mg,	Nein	Nein	Ja	
Atorvastatin-ratiopharm® Filmtabletten 10 mg; 30 mg; 60 mg	Nein	Ja	Ja	
Atorvastatin-ratiopharm® Filmtabletten 20 mg; 40 mg; 80 mg	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Atovaquon/Proguanilhydrochlorid-ratiopharm® 62,5 mg/25 mg; 250 mg/100 mg Filmtabletten	Nein	Ja	ja	
Attempta-ratiopharm® 35	Nein	Ja	Ja	
A-Z KOMPLEX-ratiopharm®	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Azathioprin-ratiopharm® 25 mg Filmtabletten	Nein	Ja**	Ja	**CMR Potential
Azathioprin-ratiopharm® 50 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja**	Ja	**CMR Potential
Azithromycin-ratiopharm® 250 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Azithromycin-ratiopharm® 500 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
<b>B</b> aclofen-ratiopharm® 10 mg; 25 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
BALDRIAN-ratiopharm®	Nein	Ja	Ja	Zerfällt nicht, vorher sorgfältig mörsern
Betahistin-ratiopharm® 6 mg Tabletten	Nein	Ja	Ja	
Betahistin-ratiopharm® 12 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Bicalutamid-ratiopharm® 50 mg; 150 mg Filmtabletten	Nein	Ja**	Ja	**CMR Potential
Biotin-ratiopharm® 5 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	

## Suspendierbar

- Hierunter wird verstanden, dass die ungeteilte Arzneiform in kaltem Leitungswasser innerhalb einer gewissen Toleranzzeit zerfällt. Bei Kapseln bezieht sich die Angabe auf das Suspendieren des Kapselinhalts.
- „Ja\*\*“ Kapseln können geöffnet werden; Retardpellets / Mikrotabletten nicht zerkleinern, sonst wird die Formulierung zerstört!
- „Nein“ Suspendierung ist nicht möglich.
- Da keine Untersuchungen zur Stabilität vorliegen, sollte eine Applikation bei geteilten bzw. gemörserten Tabletten möglichst zeitnah ( $\leq \frac{1}{2}$  Std.) erfolgen; Gleiches gilt für Suspensionen durch aufgeschlammte Pulver.

Stand Mai 2022

Präparat	Teilbar	Mörserbar	Suspendierbar	Hinweis
Bisoprolol-ratiopharm® 1,25 mg; 3,75 mg Tabletten	Nein	Ja	Ja	
Bisoprolol-ratiopharm® 2,5 mg; Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	Zum Teilen die Tablette mit der <u>Bruchkerbe nach oben</u> auf eine harte, flache Unterlage legen und mit dem Daumen oder Zeigefinger kräftig auf die Bruchkerbe drücken
Bisoprolol-ratiopharm® 3,75 mg Tabletten	Nein	Ja	Ja	
Bisoprolol-ratiopharm® 5 mg; 10 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Bisoprolol-ratiopharm® comp. 5 mg/12,5 mg; 10 mg/25 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Bosentan-ratiopharm® 62,5 mg; 125 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Bromazepam-ratiopharm® 6 mg Tabletten	3 Bruchkerben (Oblongtablette)	Ja	Ja	
Bupropion-ratiopharm® 150 mg; 300 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung	Nein	Nein	Nein	
<b>C</b> abergolin-ratiopharm® 0,5 mg; 1 mg; 2 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Calcium-ratiopharm® 500 mg Kautabletten	Nein	» Ja	Ja	
Calcium D <sub>3</sub> -ratiopharm® Brausetabletten (600 mg/400 I.E.)	Nein	Ja	Ja	Sondengabe möglich nach Ende des Sprudelvorgangs
Calcium D <sub>3</sub> -ratiopharm® forte (1200 mg/800 I.E. Brausetabletten)	Nein	Ja	Ja	Sondengabe möglich nach Ende des Sprudelvorgangs
Calcium D <sub>3</sub> -ratiopharm Kautabletten (500 mg/440 I.E.)	Nein	Ja	Ja	
Candesartan-ratiopharm® 4 mg; 8 mg; 16 mg; 32 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	Tablette zerfällt nach ca. 5-10 Minuten
Candesartan-ratiopharm® comp. Tabletten 8 mg/12,5 mg; 16 mg/12,5 mg	Bruchkerbe (nur zur Einnahmeerleichterung, nicht zur Dosishalbung)	Ja	Ja	Tablette zerfällt nach ca. 5-10 Minuten
Candesartan-ratiopharm® comp. Tabletten 32 mg/12,5 mg; 32 mg/25 mg	Bruchkerbe	Ja	Ja	Tablette zerfällt nach ca. 5-10 Minuten
Carbamazepin-ratiopharm® 400 mg Retardtabletten	Kreuzbruchkerbe (Kleeblattform)	Nein	Ja	Tablette zerfällt in Wasser, Retardierung bleibt bestehen
Carvedilol-ratiopharm® Tabletten 6,25 mg; 12,5 mg; 25 mg	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Cefpodoxim-ratiopharm® 100 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Cefpodoxim-ratiopharm® 200 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Cefuroxim-ratiopharm® 250 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	Tablette zerfällt in Wasser nach ca. 15 Min. in eine milchige Lösung
Cefuroxim-ratiopharm® 500 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	Tablette zerfällt in Wasser nach ca. 15 Min. in eine milchige Lösung

## Suspendierbar

- Hierunter wird verstanden, dass die ungeteilte Arzneiform in kaltem Leitungswasser innerhalb einer gewissen Toleranzzeit zerfällt. Bei Kapseln bezieht sich die Angabe auf das Suspendieren des Kapselinhalts.
- „Ja“ Kapseln können geöffnet werden; Retardpellets / Mikrotabletten nicht zerkleinern, sonst wird die Formulierung zerstört
- „Nein“ Suspendierung ist nicht möglich.
- Da keine Untersuchungen zur Stabilität vorliegen, sollte eine Applikation bei geteilten bzw. gemörserten Tabletten möglichst zeitnah ( $\leq \frac{1}{2}$  Std.) erfolgen; Gleiches gilt für Suspensionen durch aufgeschlämmte Pulver.

# Teilbarkeit und Suspendierbarkeit

Stand Mai 2022

Präparat	Teilbar	Mörserbar	Suspendierbar	Hinweis
Cephalexin-ratiopharm® 500 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Cephalexin-ratiopharm® 1000 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Cetirizin-ratiopharm® bei Allergien 10 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Cinacalcet-ratiopharm® 30 mg; 60 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Ciprofloxacin-ratiopharm® Filmtabletten 250 mg; 500 mg; 750 mg	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Citalopram-ratiopharm® 10 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Citalopram-ratiopharm® Filmtabletten 20 mg; 30 mg; 40 mg	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Clindamycin-ratiopharm® 300 mg Hartkapseln	Nein	Nein	Ja*	Pulver
Clindamycin-ratiopharm® 600 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	Unvollständige Auflösung des Filmüberzugs
Clomifen-ratiopharm® 50 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Clonidin-ratiopharm® Tabletten 75; 150; 300 Mikrogramm	Nein	Ja	Ja	
Clonidin-ratiopharm® 150 µg; 300 µg Weichkapseln	Nein	Nein	Nein	
Clonidin retard-ratiopharm® 250 Retardkapseln	Nein	Nein	Ja*	Pellets 0,8–1,2 mm Sondengabe bei entspr. Sondendurchmesser möglich
Clopidogrel ratiopharm 75 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Clozapin-ratiopharm® 100 mg; 200 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Cotrim-ratiopharm® 400 mg + 80 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Cotrim forte-ratiopharm® 800 mg + 160 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
<b>D</b> asatinib-ratiopharm® Filmtabletten 20 mg ; 50 mg ; 70 mg ; 80 mg, 100 mg ; 140 mg	Nein	Ja**	Ja	mutagen, teratogen, kanzerogen ⇒ **CMR Potential geringere BV
Deferasirox-ratiopharm® Filmtabletten 90 mg; 180 mg; 360 mg	Nein	Ja	Ja	Die Filmtabletten können zerkleinert und die gesamte Dosis auf weiche Speisen gestreut werden (z.B. Joghurt, püriertes Apfelmus). Bitte Dosis komplett einnehmen – nicht aufbewahren
Darunavir-ratiopharm® 600 mg; 800 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Desloratadin ratiopharm® 5 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Dexamethason-ratiopharm® 4 mg Tabletten	Kreuzbruchkerbe	Ja	Ja	
Dexamethason-ratiopharm® 8 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Diazepam-ratiopharm® 2 mg Tabletten	Nein	Ja	Ja	

## Suspendierbar

- Hierunter wird verstanden, dass die ungeteilte Arzneiform in kaltem Leitungswasser innerhalb einer gewissen Toleranzzeit zerfällt. Bei Kapseln bezieht sich die Angabe auf das Suspendieren des Kapselinhalts.
- „Ja“ Kapseln können geöffnet werden; Retardpellets / Mikrotabletten nicht zerkleinern, sonst wird die Formulierung zerstört!
- „Nein“ Suspendierung ist nicht möglich.
- Da keine Untersuchungen zur Stabilität vorliegen, sollte eine Applikation bei geteilten bzw. gemörserten Tabletten möglichst zeitnah ( $\leq \frac{1}{2}$  Std.) erfolgen; Gleiches gilt für Suspensionen durch aufgeschlammte Pulver.

Stand Mai 2022

Präparat	Teilbar	Mörserbar	Suspendierbar	Hinweis
Diazepam-ratiopharm® 5 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Diazepam-ratiopharm® 10 mg Tabletten	Kreuzbruchkerbe	Ja	Ja	
Diclofenac-ratiopharm® bei Schmerzen und Fieber 25 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Diclofenac-ratiopharm® 75 mg SL Retardkapseln	Nein	Nein	Ja*	Pellets 0,7–1,25 mm Sondengabe bei entspr. Sondendurchmesser möglich
Diclofenac-ratiopharm® 25 mg; 50 mg magensaftresistente Tabletten	Nein	Nein	Nein	
Diclofenac-ratiopharm® 100 mg Retardkapseln	Nein	Nein	Ja*	Pellets 0,5-1,25 mm Sondengabe bei entspr. Sondendurchmesser möglich
Diltiazem-ratiopharm® 60 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Domperidon-ratiopharm® 10 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	Suspension frisch herstellen und sofort verwenden (licht- und oxidationsempfindlich)!
Donepezil-HCL-ratiopharm® Filmtabletten 5 mg; 10 mg	Nein	Ja	Ja	
Doxazosin-ratiopharm® 2 mg; 4 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Doxazosin-ratiopharm® 4 mg; 8 mg Retardtabletten	Nein	Nein	Nein	
Doxepin-ratiopharm® 25 mg Filmtabletten	Kreuzbruchkerbe (Snap-Tab)	Ja	Ja	
Doxepin-ratiopharm® 50 mg; 100 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Doxy-M-ratiopharm® 100 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Doxy-M-ratiopharm® 200 mg Tabletten	Kreuzbruchkerbe (Snap-Tab)	Ja	Ja	
Dronedaron-ratiopharm® 400 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Duloxetin-ratiopharm® 30 mg; 60 mg magensaftresistente Hartkapseln	Nein	Nein	Ja*	Pellets/Suspension zeitnah applizieren
Duloxetin-ratiopharm® Uro 20 mg; 40 mg magensaftresistente Hartkapseln	Nein	Nein	Ja*	Pellets/Suspension zeitnah applizieren
Dutasterid/Tamsulosin-ratiopharm® 0,5 mg/0,4 mg Hartkapseln	Nein	Nein	Nein	
Echinacea-ratiopharm® 100 mg Tabletten	Nein	Ja	Ja	
Efavirenz Teva 600 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil- ratiopharm® 600 mg/200 mg/245 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Eisentabletten-ratiopharm® N Filmtabletten 50 mg; 100 mg	Nein	Ja	Ja	

## Suspendierbar

- Hierunter wird verstanden, dass die ungeteilte Arzneiform in kaltem Leitungswasser innerhalb einer gewissen Toleranzzeit zerfällt. Bei Kapseln bezieht sich die Angabe auf das Suspendieren des Kapselinhalts.
- „Ja“ Kapseln können geöffnet werden; Retardpellets / Mikrotabletten nicht zerkleinern, sonst wird die Formulierung zerstört!
- „Nein“ Suspendierung ist nicht möglich.
- Da keine Untersuchungen zur Stabilität vorliegen, sollte eine Applikation bei geteilten bzw. gemörserten Tabletten möglichst zeitnah ( $\leq \frac{1}{2}$  Std.) erfolgen; Gleiches gilt für Suspensionen durch aufgeschlämmte Pulver.

# Teilbarkeit und Suspendierbarkeit

Stand Mai 2022

Präparat	Teilbar	Mörserbar	Suspendierbar	Hinweis
Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil-ratiopharm® 200 mg/245 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Enalapril-ratiopharm® 2,5 mg Tabletten	Nein	Ja	Ja	Suspension frisch herstellen und zeitnah verwenden (feuchtigkeitsempfindlich)
Enalapril-ratiopharm® 5 mg; 10 mg; 20 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	Suspension frisch herstellen und zeitnah verwenden (feuchtigkeitsempfindlich)
Enalapril-ratiopharm® comp. 10 mg/25 mg Tabletten	Nein	Ja	Ja	Suspension frisch herstellen und zeitnah verwenden (feuchtigkeitsempfindlich)
Enalapril/Lercanidipin-ratiopharm® Filmtabletten 10 mg/10 mg; 20 mg/10 mg	Nein	Ja	Ja	Suspension frisch herstellen und zeitnah verwenden (feuchtigkeitsempfindlich)
Entecavir-ratiopharm® 0,5 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Entecavir-ratiopharm® 1 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Eplerenon-ratiopharm® 25 mg, 50 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Eprosartan-ratiopharm® 600 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Eprosartan-ratiopharm® comp. Filmtabletten 600 mg/12,5 mg	Nein	Ja	Ja	
Erlotinib-ratiopharm® Filmtabletten 25 mg; 100 mg; 150 mg	Nein	Ja**	Ja	**CMR Potential
Escitalopram-ratiopharm® 5 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Escitalopram-ratiopharm® 10 mg; 20 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Escitalopram-ratiopharm® 15 mg Filmtabletten	Bruchkerbe (nur zur Einnahmeerleichterung, nicht zur Dosishalbung)	Ja	Ja	
Esomeprazol-ratiopharm® 20 mg; 40 mg magensaftresistente Hartkapseln	Nein	Nein	Ja*	Zulassung zur Sondengabe Pellets 1,4 mm Bei Dünn darmsonde ist mörsern möglich
Etoricoxib-ratiopharm® 60 mg; 90 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Everolimus-ratiopharm® Tabletten 2,5 mg; 5 mg; 7,5 mg; 10 mg;	Nein	Ja**	Ja**	**CMR Potential
Exemestan-ratiopharm® 25 mg Filmtabletten	Nein	Ja**	Ja**	**CMR Potential
Ezehron Duo Tabletten 5 mg/10 mg; 10 mg/10 mg; 20 mg/10 mg	Nein	Ja	Ja	
Ezetimib 10 mg Tabletten	Nein	Ja	Ja	
Ezetimib/Atorvastatin-ratiopharm® Filmtabletten 10 mg/10 mg; 10 mg/20 mg; 10 mg/40 mg; 10 mg/80 mg	Nein	Ja	Ja	

## Suspendierbar

- Hierunter wird verstanden, dass die ungeteilte Arzneiform in kaltem Leitungswasser innerhalb einer gewissen Toleranzzeit zerfällt. Bei Kapseln bezieht sich die Angabe auf das Suspendieren des Kapselinhalts.
- „Ja“ Kapseln können geöffnet werden; Retardpellets / Mikrotabletten nicht zerkleinern, sonst wird die Formulierung zerstört
- „Nein“ Suspendierung ist nicht möglich.
- Da keine Untersuchungen zur Stabilität vorliegen, sollte eine Applikation bei geteilten bzw. gemörserten Tabletten möglichst zeitnah ( $\leq \frac{1}{2}$  Std.) erfolgen; Gleiches gilt für Suspensionen durch aufgeschlammte Pulver.

Stand Mai 2022

Präparat	Teilbar	Mörserbar	Suspendierbar	Hinweis
Ezetimib/Simvastatin-ratiopharm® Tabletten 10 mg/10 mg; 10 mg/20 mg; 10 mg/40 mg; 10 mg/80 mg	Nein	Ja	Ja	
<b>F</b> amotidin-ratiopharm® 20; 40 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Fampridin-ratiopharm® 10 mg Retardtabletten	Nein	Nein	Nein	
Febuxostat-ratiopharm 80 mg; 120 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Felodipin-ratiopharm® 2,5 mg; 5 mg; 10 mg Retardtabletten	Nein	Nein	Nein	
Femigyne-ratiopharm® N	Nein	Ja	Ja	
Finasterid-ratiopharm® 1 mg; 5 mg Filmtabletten	Nein	Ja**	Ja	teratogen ⇒**CMR Potential
Fingolimod-ratiopharm® Hartkapseln 0,25 mg; 0,5 mg	Nein	Nein	Ja	Kapseln können geöffnet werden; Sie enthalten Pulver mit kleinen Agglomeraten
Flecainid-ratiopharm® 100 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Fluconazol-ratiopharm® Hartkapseln 50 mg; 150 mg;	Nein	Nein	Ja*	Pulver
Fluoxetin-ratiopharm® 20 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	Tablette zerfällt in Wasser
Fluoxetin-ratiopharm® 20 mg Hartkapseln	Nein	Nein	Ja*	Pulver
Folsäure-ratiopharm® 5 mg Tabletten	Bruchkerbe (nur zur Einnahmeerleichterung, nicht zur Dosishalbierung)	Ja	Ja	
Furosemid-ratiopharm® 20 mg; 40 mg; 125 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	Suspension frisch herstellen und zeitnah verwenden (lichtempfindlich)
Furosemid-ratiopharm® 250 mg Tabletten	Kreuzbruchkerbe (Snap-Tab)	Ja	Ja	Suspension frisch herstellen und zeitnah verwenden (lichtempfindlich)
Furosemid-ratiopharm® 500 mg Tabletten	3 Bruchkerben (Oblongtablette)	Ja	Ja	Suspension frisch herstellen und zeitnah verwenden (lichtempfindlich)
<b>G</b> abapentin-ratiopharm® Hartkapseln 100 mg; 300 mg; 400 mg	Nein	Nein	Ja*	Pulver Der bittere Eigengeschmack des Wirkstoffs lässt sich überdecken, wenn das Pulver vorzugsweise mit Nahrung anstatt mit Wasser gemischt wird
Gabapentin-ratiopharm® 600 mg; 800 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	Der bittere Eigengeschmack des Wirkstoffs lässt sich überdecken, wenn das gemörserte Pulver vorzugsweise mit Nahrung anstatt mit Wasser gemischt wird
Galantamin-ratiopharm® 8 mg Hartkapseln retardiert	Nein	Nein	Ja*	Harkapsel enthält 1 runde bikonvexe Retardtablette (Durchmesser ca. 5 mm)  Diese kann auch aus der Kapsel genommen und separat geschluckt werden

## Suspendierbar

- Hierunter wird verstanden, dass die ungeteilte Arzneiform in kaltem Leitungswasser innerhalb einer gewissen Toleranzzeit zerfällt. Bei Kapseln bezieht sich die Angabe auf das Suspendieren des Kapselinhalts.
- „Ja“ Kapseln können geöffnet werden; Retardpellets / Mikrotabletten nicht zerkleinern, sonst wird die Formulierung zerstört
- „Nein“ Suspendierung ist nicht möglich.
- Da keine Untersuchungen zur Stabilität vorliegen, sollte eine Applikation bei geteilten bzw. gemörserten Tabletten möglichst zeitnah ( $\leq \frac{1}{2}$  Std.) erfolgen; Gleiches gilt für Suspensionen durch aufgeschlammte Pulver.

Stand Mai 2022

Präparat	Teilbar	Mörserbar	Suspendierbar	Hinweis
Galantamin-ratiopharm® 16 mg Hartkapseln retardiert	Nein	Nein	Ja*	Hartkapsel enthält 2 runde bikonvexe Retardtabletten (Durchmesser ca. 5 mm)  Diese können auch aus der Kapsel genommen und separat geschluckt werden
Galantamin-ratiopharm® 24 mg Hartkapseln retardiert	Nein	Nein	Ja*	Hartkapsel enthält 3 runde bikonvexe Retardtabletten (Durchmesser ca. 5 mm)  Diese können auch aus der Kapsel genommen und separat geschluckt werden
Gefitinib-ratiopharm® 250 mg Filmtabletten	Nein	Ja**	Ja	**CMR Potential
Ginkobil® ratiopharm® 40 mg; 80 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Ginkobil® ratiopharm 120 mg Filmtabletten	Bruchkerbe (nur zur Einnahme- erleichterung, nicht zur Dosishalbung)	Ja	Ja	
Ginkobil® ratiopharm 240 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Glib-ratiopharm® S 1,75 mg; 3,5 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Glimepirid-ratiopharm® 1 mg Tabletten	Nein	Ja	Ja	
Glimepirid-ratiopharm® Tabletten 2 mg; 3 mg; 4 mg; 6 mg	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Granisetron-ratiopharm® 1 mg; 2 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Haloperidol-ratiopharm® 5 mg Tabletten	Kreuzbruchkerbe	Ja	Ja	
Haloperidol-ratiopharm® 10 mg Tabletten	Kreuzbruchkerbe (Snap-Tab)	Ja	Ja	
HCT-ratiopharm® 25 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
HerzASS-ratiopharm® 50 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
HerzASS-ratiopharm® 100 mg Tabletten	Kreuzbruchkerbe	Ja	Ja	
Hustenstiller-ratiopharm® Dextromethorphan	Nein	Nein	Ja	Pulver
Hydromorphon-ratiopharm® 4 mg; 8 mg; 16 mg; 24 mg Retardtabletten	Bruchkerbe	Nein	Nein	
Hydromorphon-HCl-ratiopharm® Hartkapseln, retardiert 2 mg; 4 mg; 8 mg; 16 mg; 24 mg	Nein	Nein	Ja*	Pelletgröße ≤ 1100 µm Sondengabe bei entspr. Sondendurchmesser möglich
Hydrotalcit-ratiopharm® 500 mg Kautabletten	Nein	Ja	Ja	Schmuckkerbe – nicht zum Teilen
Hydroxychloroquin-ratiopharm® 200 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Ibandronsäure ratiopharm® Filmtabletten 50 mg; 150 mg	Nein	Nein	Nein	Zusätzliche Information auf Nachfrage

## Suspendierbar

- Hierunter wird verstanden, dass die ungeteilte Arzneiform in kaltem Leitungswasser innerhalb einer gewissen Toleranzzeit zerfällt.  
Bei Kapseln bezieht sich die Angabe auf das Suspendieren des Kapselinhalts.
- „Ja“ Kapseln können geöffnet werden; Retardpellets / Mikrotabletten nicht zerkleinern, sonst wird die Formulierung zerstört
- „Nein“ Suspendierung ist nicht möglich.
- Da keine Untersuchungen zur Stabilität vorliegen, sollte eine Applikation bei geteilten bzw. gemörserten Tabletten möglichst zeitnah (≤ ½ Std.) erfolgen; Gleiches gilt für Suspensionen durch aufgeschlammte Pulver.



Stand Mai 2022

Präparat	Teilbar	Mörserbar	Suspendierbar	Hinweis
Ibu-ratiopharm® 400 mg; 600 mg; 800 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Ibu-ratiopharm 200 mg akut Schmerztabletten	Nein	Ja	Ja	
IBU-ratiopharm® 400 mg akut Schmerztabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
IBU-ratiopharm® direkt 200 mg; 400 mg Pulver zum Einnehmen	Nein	Ja	Ja	
IBU-LYSIN-ratiopharm® 293 mg	Bruchkerbe	Ja	Ja	
IBU-LYSIN-ratiopharm® 400 mg	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Imatinib-ratiopharm 100 mg; 400 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja**	Ja	mutagen, teratogen, kanzerogen ⇒ **CMR Potential
Indapamid-ratiopharm® 1,5 mg Retardtabletten	Nein	Nein	Nein	
Indomet-ratiopharm® 75 mg Retardkapseln	Nein	Nein	Ja*	Pellets 0,5-1,25 mm
Irbesartan comp. ratiopharm® 150 mg/12,5 mg; 300 mg/12,5 mg Filmtabletten	Bruchkerbe (nur zur Einnahme- erleichterung, nicht zur Dosishalbung)	Ja	Ja	
Irbesartan comp. ratiopharm® 300 mg/25 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Irbesartan-ratiopharm® 75 mg; 225 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Irbesartan-ratiopharm® 150 mg; 300 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
IS 5 mono-ratiopharm® 20 mg; 40 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
IS 5 mono-ratiopharm® 40 mg; 60 mg; 100 mg Retardtabletten	Bruchkerbe	Nein	Nein	
ISDN-ratiopharm® 5 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Isotretinoin-ratiopharm® 10 mg; 20 mg Weichkapseln	Nein	Nein	Nein	
Itraconazol-ratiopharm® 100 mg Hartkapseln	Nein	Nein	Ja*	Pellets 1 mm Sondengabe bei entspr. Sondendurchmesser möglich
Ivabradin-ratiopharm® 5 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Jodid-ratiopharm® 100 µg; 200 µg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Lamivudin Teva B.V. 150 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Lamivudin Teva B.V. 300 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Lamivudin/Zidovudin Teva 150 mg; 300 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Lamotrigin-ratiopharm® 50 mg; 100 mg, 200 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	Nein	Ja	Ja	Tabletten zerfallen sofort in Wasser - deshalb kein mörsern notwendig

## Suspendierbar

- Hierunter wird verstanden, dass die ungeteilte Arzneiform in kaltem Leitungswasser innerhalb einer gewissen Toleranzzeit zerfällt.  
Bei Kapseln bezieht sich die Angabe auf das Suspendieren des Kapselinhalts.
- „Ja“ Kapseln können geöffnet werden; Retardpellets / Mikrotabletten nicht zerkleinern, sonst wird die Formulierung zerstört
- „Nein“ Suspendierung ist nicht möglich.
- Da keine Untersuchungen zur Stabilität vorliegen, sollte eine Applikation bei geteilten bzw. gemörserten Tabletten möglichst zeitnah ( $\leq \frac{1}{2}$  Std.) erfolgen; Gleiches gilt für Suspensionen durch aufgeschlammte Pulver.

Stand Mai 2022

Präparat	Teilbar	Mörserbar	Suspendierbar	Hinweis
Lansoprazol-ratiopharm® 15 mg / 30 mg magensaftresistente Hartkapseln	Nein	Nein	Ja*	Pellets < 1,25 mm Sondengabe bei entspr. Sondendurchmesser möglich. Bei Dünndarmsonde ist mörsern möglich
LaYaisa 0,02 mg/3 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
LaYanina 0,03 mg/3mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Leflunomid ratiopharm® 10 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Leflunomid ratiopharm® 20 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Lenalidomid-ratiopharm® Hartkapseln 2,5 mg; 5 mg; 7,5 mg 10 mg; 15 mg; 20 mg	Nein	Nein	Nein	teratogen Schwangerschafts- verhütungsprogramm da schwere Fehlbildungen möglich!
Levetiracetam-ratiopharm® Filmtabletten 250 mg; 500 mg; 750 mg; 1000 mg; 1500 mg	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Levocetirizin-ratiopharm® 5 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Levodopa/Benserazid-ratiopharm® Tabletten 50 mg/12,5 mg; 100 mg/25 mg; 200 mg/50 mg	Bruchkerbe	Ja	Ja	Durch ständiges Umrühren und leichtes Zerstoßen mit dem Löffel kann eine gute Suspendierbarkeit in Wasser in ca. 5 Min erreicht werden
Levodopa/Carbidopa-ratiopharm® 100 mg/25 mg; 200 mg/50 mg Tabletten	Kreuzbruchkerbe (Snap-Tab)	Ja	Ja	Möglichst sofort nach dem Mörsern oder Suspendieren applizieren. (Carbidopa ist oxidationsempfindlich)
Levodopa/Carbidopa-ratiopharm® 100/25 mg; 200/50 mg Retardtabletten	Nein	Nein	Nein	
Levodopa/Carpidopa/ Entacapon-ratiopharm® Filmtabletten 50 mg/12,5 mg/200 mg; 75 mg/18,75 mg/200 mg 100 mg/25 mg/ 200 mg; 125 mg/31,25 mg/200 mg 150 mg/37,5 mg/200 mg; 175 mg/43,75 mg/200 mg 200 mg/50 mg/200 mg	Nein	Ja	Ja	Möglichst sofort nach dem Mörsern oder Suspendieren applizieren. (Carbidopa ist oxidationsempfindlich)
Levofloxacin-ratiopharm® Filmtabletten 250 mg; 500 mg	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Liana-ratiopharm®	Nein	Ja	Ja	
Linezolid-ratiopharm 600 mg Filmtabletten	Bruchkerbe (nur zur Einnahme- erleichterung, nicht zur Dosishalbung)	Ja	Ja	
Liponsäure-ratiopharm® 600 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Lisinopril-ratiopharm® 2,5 mg Tabletten	Nein	Ja	Ja	
Lisinopril-ratiopharm® 5 mg; 10 mg; 20 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Lisinopril-ratiopharm® comp. 10 mg/12,5 mg Tabletten	Nein	Ja	Ja	
Lisinopril-ratiopharm® comp. 20 mg/12,5 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	

### Suspendierbar

- Hierunter wird verstanden, dass die ungeteilte Arzneiform in kaltem Leitungswasser innerhalb einer gewissen Toleranzzeit zerfällt.  
Bei Kapseln bezieht sich die Angabe auf das Suspendieren des Kapselinhalts.
- „Ja“ Kapseln können geöffnet werden; Retardpellets / Mikrotabletten nicht zerkleinern, sonst wird die Formulierung zerstört!
- „Nein“ Suspendierung ist nicht möglich.
- Da keine Untersuchungen zur Stabilität vorliegen, sollte eine Applikation bei geteilten bzw. gemörserten Tabletten möglichst zeitnah ( $\leq \frac{1}{2}$  Std.) erfolgen; Gleiches gilt für Suspensionen durch aufgeschlammte Pulver.

Stand Mai 2022

Präparat	Teilbar	Mörserbar	Suspendierbar	Hinweis
Loperamid-ratiopharm® 2 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Loperamid-ratiopharm® akut 2 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Loratadin-ratiopharm® 10 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Lorazepam-ratiopharm® 2,5 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Losartan-ratiopharm® 12,5 mg; Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Losartan-ratiopharm® 25 mg; 50 mg; 100 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Losartan-ratiopharm® comp. 50 mg/12,5 mg; 100 mg/25 mg Filmtabletten	Bruchkerbe (nur zur Einnahmeerleichterung, nicht zur Dosishalbung)	Ja	Ja	
Losartan-ratiopharm® comp. 100 mg/12,5 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
L-Thyroxin-Na-ratiopharm® 25; 50; 75; 88; 100; 112; 125; 137; 150; 175; 200 Mikrogramm Tabletten	Kreuzbruchkerbe	Ja	Ja	
<b>M</b> agaldrat-ratiopharm® 800 mg Kautabletten	Bruchkerbe (nur zur Einnahmeerleichterung, nicht zur Dosishalbung)	Ja	Ja	
Magnesium und Vitamin E-ratiopharm®	Nein	Nein	Nein	
Maprotilin-ratiopharm® 25 mg; 50 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Maprotilin-ratiopharm® 75 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
MCP-ratiopharm® 10 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Melperon-ratiopharm® 25 mg Filmtabletten	Kreuzbruchkerbe (Snap-Tab)	Ja	Ja	
Melperon-ratiopharm® 50 mg; 100 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Memantin-ratiopharm® 10 mg; 20 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Metformin-ratiopharm® 500 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Metformin-ratiopharm® 850 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	Umstellung von BK auf keine Bruchkerbe - zur Zeit noch beide Varianten im Handel
Metformin-ratiopharm® 1000 mg Filmtabletten	Bruchkerbe (nur zur Einnahmeerleichterung, nicht zur Dosishalbung)	Ja	Ja	
Methylphenidat-HCl-ratiopharm® Retardtabletten 18 mg; 27 mg; 36 mg; 54 mg	Nein	Nein	Nein	
Metoprolol-ratiopharm® 50 mg; 100 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Metoprolol-ratiopharm® 200 mg Retardtabletten	Bruchkerbe	Nein	Nein	
Metoprolol-ratiopharm® comp. 100 mg/12,5 mg Tabletten	Bruchkerbe (nur zur Einnahmeerleichterung, nicht zur Dosishalbung)	Ja	Ja	

## Suspendierbar

- Hierunter wird verstanden, dass die ungeteilte Arzneiform in kaltem Leitungswasser innerhalb einer gewissen Toleranzzeit zerfällt. Bei Kapseln bezieht sich die Angabe auf das Suspendieren des Kapselinhalts.
- „Ja“ Kapseln können geöffnet werden; Retardpellets / Mikrotabletten nicht zerkleinern, sonst wird die Formulierung zerstört
- „Nein“ Suspendierung ist nicht möglich.
- Da keine Untersuchungen zur Stabilität vorliegen, sollte eine Applikation bei geteilten bzw. gemörserten Tabletten möglichst zeitnah ( $\leq \frac{1}{2}$  Std.) erfolgen; Gleiches gilt für Suspensionen durch aufgeschlammte Pulver.

Stand Mai 2022

Präparat	Teilbar	Mörserbar	Suspendierbar	Hinweis
Metoprolol-ratiopharm® NK 50 mg; 100 mg; 200 mg Retardtabletten	Bruchkerbe	Nein	Ja*	Pellets < 1,25 mm Ein minimales Aufquellen der Pellets muss berücksichtigt werden
Metoprolol-ratiopharm® Succinat 23,75 mg; 47,5 mg; 95 mg; 190 mg Retardtabletten	Bruchkerbe	Nein	Ja*	Pellets < 1,25 mm
Metronidazol-ratiopharm® 400 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Minocyclin-ratiopharm® 50 mg; 100 mg Hartkapseln	Nein	Nein	Ja*	Pulver
Mirtazapin-ratiopharm® 15 mg Filmtabletten	Bruchkerbe (nur zur Einnahmeerleichterung, nicht zur Dosishalbierung)	Ja	Ja	
Mirtazapin-ratiopharm® 45 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Mirtazapin-ratiopharm® 15 mg; 30 mg; 45 mg Schmelztabletten	Nein	»Nein	Ja	*mörsern ist nicht erforderlich da gut suspendierbar
Moclobemid-ratiopharm® 150 mg; 300 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Montelukast-ratiopharm® 10 mg Filmtabletten; junior 5 mg Kautabletten	Nein	Ja	Ja	
Montelukast-ratiopharm® 4 mg Granulat	Nein	Nein	Nein	Ist nicht zum Auflösen in Flüssigkeit geeignet
Morphin-ratiopharm® 10 mg; 30 mg; 60 mg; 100 mg Retardtabletten	Nein	Nein	Nein	
Moxifloxacin-ratiopharm® 400 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Moxonidin-ratiopharm® 0,2 mg; 0,3 mg; 0,4 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
<b>N</b> AC-ratiopharm® Hustenlöser Brausetabletten akut 200 mg; akut 600 mg	Bruchkerbe	Ja	Ja	Sondengabe möglich nach Ende des Sprudelvorgangs
NAC-ratiopharm® 200 mg Trinktabletten	Nein	Ja	Ja	
NAC-ratiopharm® 200 mg; 600 mg Brausetabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	Sondengabe möglich nach Ende des Sprudelvorgangs
Naproxen-ratiopharm® Schmerztabletten	Nein	Ja	Ja	
Naratriptan-ratiopharm® 2,5 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Naratriptan-ratiopharm® bei Migräne 2,5 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Neuro-ratiopharm® 100 mg/100 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Nevirapin-ratiopharm® 200 mg Tabletten	Bruchkerbe (nur zur Einnahmeerleichterung, nicht zur Dosishalbierung)	Ja	Ja	
Nevirapin-ratiopharm® 400 Retardtabletten	Nein	Nein	Nein	
Nifedipin-ratiopharm® 20 mg Retardtabletten	Bruchkerbe (nur zur Einnahmeerleichterung, nicht zur Dosishalbierung)	Nein	Nein	Aufgrund der Lichtempfindlichkeit darf die Tablettenhälfte nicht ohne Lichtschutz aufbewahrt werden.

## Suspendierbar

- Hierunter wird verstanden, dass die ungeteilte Arzneiform in kaltem Leitungswasser innerhalb einer gewissen Toleranzzeit zerfällt. Bei Kapseln bezieht sich die Angabe auf das Suspendieren des Kapselinhalts.
- „Ja“ Kapseln können geöffnet werden; Retardpellets / Mikrotabletten nicht zerkleinern, sonst wird die Formulierung zerstört!
- „Nein“ Suspendierung ist nicht möglich.
- Da keine Untersuchungen zur Stabilität vorliegen, sollte eine Applikation bei geteilten bzw. gemörserten Tabletten möglichst zeitnah ( $\leq \frac{1}{2}$  Std.) erfolgen; Gleiches gilt für Suspensionen durch aufgeschlämmte Pulver.

Stand Mai 2022

Präparat	Teilbar	Mörserbar	Suspendierbar	Hinweis
Nitrendipin-ratiopharm® 10 mg Tabletten	Nein	Ja	Ja	
Nitrendipin-ratiopharm® 20 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Novaminsulfon-ratiopharm® 500 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	Suspension frisch herstellen und zeitnah verwenden (temperatur- und lichtempfindlich)
<b>O</b> floxacin-ratiopharm® 100 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Ofloxacin-ratiopharm® 200 mg; 400 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Olanzapin-ratiopharm® Tabletten 2,5 mg; 5 mg; 7,5 mg; 10 mg; 15 mg; 20 mg	Nein	Ja	Ja	
Olanzapin-ratiopharm® Schmelztabletten 5 mg; 7,5 mg; 10 mg; 15 mg; 20 mg	Nein	»Nein	Ja	*mörsern nicht erforderlich da gut suspendierbar
Olmedipin 20 mg/5 mg; 40 mg/5 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Olmedipin 40 mg/10 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Olmesartan-ratiopharm® 10 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Olmesartan-ratiopharm® 20 mg; 40 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Olmesartan/Amlodipin/HCT-ratiopharm® Filmtabletten 20 mg/5 mg/12,5 mg; 40 mg/ 5 mg/12,5 mg; 40 mg/ 5 mg/ 25 mg 40 mg/10 mg/25 mg; 40 mg/10 mg/12,5 mg	Nein	Ja	Ja	
Olmesartan comp. ratiopharm® Filmtabletten 20 mg/12,5 mg; 40 mg/12,5 mg	Nein	Ja	Ja	
Olmesartan comp. ratiopharm® Filmtabletten 20 mg/25 mg; 40 mg/25 mg	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Olmedipin- ratiopharm® Filmtabletten 20 mg/5mg; 40 mg/5mg	Nein	Ja	Ja	
Olmedipin-ratiopharm® 40 mg/10 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Omeprazol-ratiopharm® NT 10 mg; 20 mg; 40 mg magensaftresistente Hartkapseln	Nein	Nein	Ja*	Pellets 1,25-1,5 mm Sondengabe bei entspr. Sondendurchmesser möglich <i>Bei Dünn darmsonde ist mörsern möglich</i>
Omeprazol-ratiopharm® SK 20 mg magensaftresistente Hartkapseln	Nein	Nein	Ja*	Pellets 0,84-1,25 mm Sondengabe bei entspr. Sondendurchmesser möglich. <i>Bei Dünn darmsonde ist mörsern möglich</i>
Ondansetron-ratiopharm® 4 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Ondansetron-ratiopharm® 8 mg Filmtabletten	Bruchkerbe (nur zur Einnahme- erleichterung, nicht zur Dosishalbung)	Ja	Ja	
Ondansetron-ratiopharm® 4 mg; 8 mg Schmelztabletten	Nein	»Nein	Ja	*mörsern nicht erforderlich da gut suspendierbar
Opi Pramol-ratiopharm® 50 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	

## Suspendierbar

- Hierunter wird verstanden, dass die ungeteilte Arzneiform in kaltem Leitungswasser innerhalb einer gewissen Toleranzzeit zerfällt. Bei Kapseln bezieht sich die Angabe auf das Suspendieren des Kapselinhalts.
- „Ja“ Kapseln können geöffnet werden; Retardpellets / Mikrotabletten nicht zerkleinern, sonst wird die Formulierung zerstört
- „Nein“ Suspendierung ist nicht möglich.
- Da keine Untersuchungen zur Stabilität vorliegen, sollte eine Applikation bei geteilten bzw. gemörserten Tabletten möglichst zeitnah ( $\leq \frac{1}{2}$  Std.) erfolgen; Gleiches gilt für Suspensionen durch aufgeschlämmte Pulver.

Stand Mai 2022

Präparat	Teilbar	Mörserbar	Suspendierbar	Hinweis
Opi Pramol-ratiopharm® 100 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Orlistat-ratiopharm® 60 mg; 120 mg Hartkapseln	Nein	Nein	Ja*	Pulver
Oxazepam-ratiopharm® 10 mg Tabletten	Kreuzbruchkerbe (Snap-Tab)	Ja	Ja	
Oxazepam-ratiopharm® 50 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Oxcarbazepin-ratiopharm® 150 mg; 300 mg; 600 mg Filmtabletten	Bruchkerbe (nur zur Einnahmehilfe, nicht zur Dosisanpassung)	Ja	Ja	
Oxybutynin-ratiopharm® 2,5 mg Tabletten	Nein	Ja	Ja	
Oxybutynin-ratiopharm® 5 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Oxycodon-HCl-ratiopharm® Retardtabletten 5 mg	Nein	Nein	Nein	
Oxycodon-HCl-ratiopharm® Retardtabletten 10 mg; 20 mg; 40 mg; 80 mg	Bruchkerbe	Nein	Ja*	Pelletgröße ≤ 800 µm zerfällt in Wasser -wenn man ein wenig umrührt - innerhalb 1 Minute
Oxycodon-HCl-ratiopharm® Retardtabletten 30 mg; 60 mg	Bruchkerbe	Nein	Nein	
Oxycodon-HCl-ratiopharm akut Hartkapseln 5 mg, 10 mg, 20 mg	Nein	Nein	Ja*	Pulver
Oxycocomp-ratiopharm® Retardtabletten 5 mg/2,5 mg	Nein	Nein	Nein	
Oxycocomp-ratiopharm® Retardtabletten 10 mg/5 mg; 20 mg/10 mg; 30 mg/15 mg; 40 mg/20 mg	Bruchkerbe	Nein	Nein	
<b>P</b> ankreatin Mikro-ratiopharm® 20 000 magensaftresistente Hartkapseln	Nein	Nein	Ja*	Minitabletten 2,0-2,4 mm Sondengabe bei entspr. Sondendurchmesser möglich. Bei Dünn darmsonde ist mörsern möglich
Pantoprazol-ratiopharm® 20 mg; 40 mg magensaftresistente Tabletten	Nein	Nein	Nein	Bei Dünn darmsonde ist mörsern möglich
Pantoprazol-ratiopharm® SK 20 mg magensaftresistente Tabletten	Nein	Nein	Nein	Bei Dünn darmsonde ist mörsern möglich.
Paracetamol 500 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Paracetamol-ratiopharm® 500 mg; 1000 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Paracetamol-ratiopharm® 500 mg Brausetabletten	Nein	Ja	Ja	Sondengabe möglich nach Ende des Sprudelvorgangs
Paracetamol/Ibuprofen-ratiopharm® 500 mg/200 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Paricalcitol-ratiopharm® 1 Mikrogramm Weichkapseln	Nein	Nein	Nein	
Paroxetin-ratiopharm® 20 mg; 30 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	

## Suspendierbar

- Hierunter wird verstanden, dass die ungeteilte Arzneiform in kaltem Leitungswasser innerhalb einer gewissen Toleranzzeit zerfällt. Bei Kapseln bezieht sich die Angabe auf das Suspendieren des Kapselinhalts.
- „Ja“ Kapseln können geöffnet werden; Retardpellets / Mikrotabletten nicht zerkleinern, sonst wird die Formulierung zerstört!
- „Nein“ Suspendierung ist nicht möglich.
- Da keine Untersuchungen zur Stabilität vorliegen, sollte eine Applikation bei geteilten bzw. gemörserten Tabletten möglichst zeitnah (≤ ½ Std.) erfolgen; Gleiches gilt für Suspensionen durch aufgeschlammte Pulver.

Stand Mai 2022

Präparat	Teilbar	Mörserbar	Suspendierbar	Hinweis
Paroxetin-ratiopharm® 40 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Penicillin V-ratiopharm® 1 Mega; 1,5 Mega Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Pentoxifyllin-ratiopharm® 400 mg; 600 mg Retardtabletten	Bruchkerbe	Nein	Nein	
Perindopril-Erbumin/Indapamid-ratiopharm® 8 mg/2,5 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Perindopril/Indapamid-ratiopharm® T 2 mg/0,625 mg Tabletten	Bruchkerbe (nur zur Einnahmeerleichterung, nicht zur Dosishalbung)	Ja	Ja	
Perindopril/Indapamid-ratiopharm® T 4 mg/1,25 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Perindopril/Indapamid-ratiopharm® T 2,5 mg/0,625 mg Filmtabletten	Bruchkerbe (nur zur Einnahmeerleichterung, nicht zur Dosishalbung)	Ja	Ja	
Perindopril/Indapamid-ratiopharm® T 5 mg/1,25 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Phenpro.-ratiopharm® 3 mg Tabletten	Kreuzbruchkerbe	Ja	Ja	
Piracetam-ratiopharm® 800 mg; 1200 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Posaconazol-ratiopharm® 100 mg Tabletten	Nein	Nein	Nein	
Pramipexol-ratiopharm® Retardtabletten 0,26 mg; 0,52 mg; 1,05 mg; 1,57 mg, 2,1 mg; 2,62 mg; 3,15 mg	Nein	Nein	Nein	
Pramipexol-ratiopharm® 0,088 mg Tabletten	Nein	Ja	k. A.	Zusätzliche Information auf Nachfrage
Pramipexol-ratiopharm® 0,18 mg; 0,35 mg; 0,7 mg; 1,1 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	k. A.	Zusätzliche Information auf Nachfrage
Prasugrel-ratiopharm® 5 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Prasugrel-ratiopharm® 10 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Pravastatin-ratiopharm® 10 mg; 20 mg; 40 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Pregabalin-ratiopharm Hartkapseln 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg, 300 mg	Nein	Nein	Ja*	Pulver bildet Agglomerate, die (jedoch) nach wenigen Minuten zerfallen
Propafenon-ratiopharm® 150 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Propafenon-ratiopharm® 300 mg Filmtabletten	Kreuzbruchkerbe	Ja	Ja	
Propra-ratiopharm® 10 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Propra-ratiopharm® 40 mg Filmtabletten	Kreuzbruchkerbe	Ja	Ja	
Propra-ratiopharm® 80 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Propra comp.-ratiopharm® Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	

## Suspendierbar

- Hierunter wird verstanden, dass die ungeteilte Arzneiform in kaltem Leitungswasser innerhalb einer gewissen Toleranzzeit zerfällt. Bei Kapseln bezieht sich die Angabe auf das Suspendieren des Kapselinhalts.
- „Ja“ Kapseln können geöffnet werden; Retardpellets / Mikrotabletten nicht zerkleinern, sonst wird die Formulierung zerstört!
- „Nein“ Suspendierung ist nicht möglich.
- Da keine Untersuchungen zur Stabilität vorliegen, sollte eine Applikation bei geteilten bzw. gemörserten Tabletten möglichst zeitnah ( $\leq \frac{1}{2}$  Std.) erfolgen; Gleiches gilt für Suspensionen durch aufgeschlammte Pulver.

# Teilbarkeit und Suspendierbarkeit

Stand Mai 2022

Präparat	Teilbar	Mörserbar	Suspendierbar	Hinweis
Quetiapin-ratiopharm® Filmtabletten 25 mg; 100 mg; 150 mg; 200 mg; 300 mg	Nein	Ja	Ja	
Quetiapin-ratiopharm® Retardtabletten 50 mg; 150 mg; 200 mg; 300 mg; 400 mg	Nein	Nein	Nein	
<b>R</b> abeprazol-ratiopharm 10 mg; 20 mg magensaftresistente Tabletten	Nein	Nein	Nein	Bei Dünn darmsonde ist mörsern möglich
Raloxifen Teva 60 mg Filmtabletten	Nein	Ja**	Ja	**CMR Potential
Ramipril-ratiopharm® 2,5 mg; 5 mg; 10 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Ramipril-ratiopharm® comp. Tabletten 2,5 mg/12,5 mg; 5 mg/12,5 mg; 5 mg/25 mg	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Ramipril/Amlodipin-ratiopharm® Hartkapseln	Nein	Nein	Ja*	Pulver
Rasagilin-ratiopharm 1 mg Tabletten	Nein	Ja	Ja	
ratioGrippal 200 mg/30 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Reisetabletten-ratiopharm®	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Repaglinid-ratiopharm® 0,5 mg; 1 mg; 2 mg Tabletten	Nein	Ja	Ja	
Ribavirin-ratiopharm® 200 mg; 400 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Riluzol-ratiopharm® 50 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Ropinirol-ratiopharm® Filmtabletten 0,25 mg; 0,5 mg; 1 mg; 2 mg; 3 mg; 4 mg	Nein	Ja	Ja	
Ropinirol-ratiopharm® 2 mg; 4 mg; 8 mg Retardtabletten	Nein	Nein	Nein	
Rosuvastatin-ratiopharm® 5 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Rosuvastatin-ratiopharm® 10 mg; 20 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Rosuvastatin/Amlodipin-ratiopharm Hartkapseln 10 mg/5 mg; 10 mg/10 mg; 20 mg/5 mg; 20 mg/10 mg	Nein	Nein	Ja	
Roxithromycin-ratiopharm® 150 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Roxithromycin-ratiopharm® 300 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
<b>S</b> chlafTabs-ratiopharm® 25 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Sertralin-ratiopharm® 50 mg; 100 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Sevelamercarbonat-ratiopharm® 800 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Sildenafil-ratiopharm® 25 mg; 75 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Sildenafil-ratiopharm® 50 mg; 100 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Sildenafil-ratiopharm® PAH 20 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Silymarin-CT Hartkapseln	Nein	Ja	Ja*	Pulver
Silymarin forte-CT Hartkapseln	Nein	Ja	Ja*	Pulver

## Suspendierbar

- Hierunter wird verstanden, dass die ungeteilte Arzneiform in kaltem Leitungswasser innerhalb einer gewissen Toleranzzeit zerfällt.  
Bei Kapseln bezieht sich die Angabe auf das Suspendieren des Kapselinhalts.
- „Ja“ Kapseln können geöffnet werden; Retardpellets / Mikrotabletten nicht zerkleinern, sonst wird die Formulierung zerstört!
- „Nein“ Suspendierung ist nicht möglich.
- Da keine Untersuchungen zur Stabilität vorliegen, sollte eine Applikation bei geteilten bzw. gemörserten Tabletten möglichst zeitnah ( $\leq \frac{1}{2}$  Std.) erfolgen; Gleiches gilt für Suspensionen durch aufgeschlammte Pulver.



# Teilbarkeit und Suspendierbarkeit

Stand Mai 2022

Präparat	Teilbar	Mörserbar	Suspendierbar	Hinweis
Simethicon-ratiopharm® 85 mg Kautabletten	Bruchkerbe		Ja	Flüssige Darreichungsformen bevorzugen Suspension frisch herstellen und zeitnah verwenden (feuchtigkeitsempfindlich)
Simvastatin ratiopharm® Filmtabletten 10 mg; 20 mg; 30 mg; 40 mg; 60 mg; 80 mg	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Solifenactin 5 mg; 10 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Sorafenib-ratiopharm® 200 mg Filmtabletten	Nein	Ja**	Ja	**CMR Potential
Sotalol-ratiopharm® 40 mg Tabletten	Nein	Ja	Ja	
Sotalol-ratiopharm® 80 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Sotalol-ratiopharm® 160 mg Tabletten	Kreuzbruchkerbe (Snap-Tab)	Ja	Ja	
Spiro comp.-ratiopharm® 50 mg/20 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Spiro comp. forte-ratiopharm® 100 mg/20 mg Filmtabletten	Kreuzbruchkerbe	Ja	Ja	
Spironolacton-ratiopharm® 50 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Spironolacton-ratiopharm® 100 mg Tabletten	Kreuzbruchkerbe	Ja	Ja	
Sultamicillin-ratiopharm® 375 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Sumatriptan-ratiopharm® 50 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Sumatriptan-ratiopharm® 100 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Sunitinib-ratiopharm Hartkapseln	Nein	Nein	Ja**	**CMR Potential
Tadalafil-ratiopharm® 5 mg; 10 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Tadalafil-ratiopharm® 20 mg Filmtabletten	Kreuzbruchkerbe	Ja	Ja	
Tadalafil PAH-ratiopharm® 20 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	Umstellung auf Kreuzbruchkerbe –zur Zeit noch beide Varianten im Handel
Tamoxifen-ratiopharm® 20 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja**	Ja	**CMR Potential
Tamsulosin-ratiopharm® 0,4 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung	Nein	Nein	Ja*	Pellets 0,3-1,2 mm Sondengabe bei entspr. Sondendurchmesser möglich Suspendierbar nur in sauren Getränken.
Telmisartan comp-ratiopharm® 40 mg/12,5 mg Tabletten	Nein	Ja	Ja	
Telmisartan comp-ratiopharm® 80 mg/12,5 mg Tabletten	Bruchkerbe (nur zur Einnahmehilfe, nicht zur Dosishalbung)	Ja	Ja	
Telmisartan comp-ratiopharm® 80 mg/25 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Telmisartan-ratiopharm® 20 mg Tabletten	Nein	Ja	Ja	

## Suspendierbar

- Hierunter wird verstanden, dass die ungeteilte Arzneiform in kaltem Leitungswasser innerhalb einer gewissen Toleranzzeit zerfällt. Bei Kapseln bezieht sich die Angabe auf das Suspendieren des Kapselinhalts.
- „Ja“ Kapseln können geöffnet werden; Retardpellets / Mikrotabletten nicht zerkleinern, sonst wird die Formulierung zerstört!
- „Nein“ Suspendierung ist nicht möglich.
- Da keine Untersuchungen zur Stabilität vorliegen, sollte eine Applikation bei geteilten bzw. gemörsterten Tabletten möglichst zeitnah ( $\leq \frac{1}{2}$  Std.) erfolgen; Gleiches gilt für Suspensionen durch aufgeschlämmte Pulver.

Stand Mai 2022

Präparat	Teilbar	Mörserbar	Suspendierbar	Hinweis
Telmisartan-ratiopharm® 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Temozolomid-ratiopharm® Hartkapseln 5 mg; 20 mg; 100 mg; 140 mg; 180 mg; 250 mg	Nein	Nein	Ja**	mutagen, teratogen, kanzerogen ⇒**CMR Potential
Tenofoviridisoproxil-ratiopharm 245 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Terbinafin-ratiopharm® 250 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
TEUFELSKRALLE-ratiopharm® 480 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Theophyllin retard-ratiopharm® Retardkapseln 125 mg; 250 mg; 375 mg; 500 mg	Nein	Nein	Ja*	Pellets 1,0-2,0 mm Sondengabe bei entspr. Sondendurchmesser möglich
Ticlopidin-ratiopharm® 250 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Tilidin-ratiopharm® plus Retardtabletten 50 mg/4 mg; 100 mg/ 8 mg; 150 mg/12 mg;	Nein	Nein	Nein	
Tolterodin-ratiopharm® 2 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Tolterodin-ratiopharm® 4 mg Retardkapseln	Nein	Nein	Ja*	Kapsel enthält 4 weiße runde bikonvexe Filmtabletten
Tolvaptan-ratiopharm® Tabletten 15 mg + 45 mg; 30 mg + 60 mg; 30 mg + 90 mg	Nein	Ja	Ja	
Tolvaptan-ratiopharm® SIADH Tabletten 15 mg; 30 mg	Nein	Ja	Ja	
Topiramat-ratiopharm® 25 mg; 50 mg; 100 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Torasemid-ratiopharm® 10 mg; 20 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Torasemid-ratiopharm® 200 mg Tabletten	Kreuzbruchkerbe	Ja	Ja	
Tovedeso® 3,5 mg; 7 mg Retardtabletten	Nein	Nein	Nein	
Tramadol-ratiopharm® 50 mg Hartkapseln	Nein	Nein	Ja*	Pulver
Tramadol-ratiopharm® 50 mg; 150 mg; 200 mg Retardkapseln	Nein	Nein	Ja*	Pellets 1,0 - 1,6 mm Sondengabe bei entspr. Sondendurchmesser möglich
Tramadol-ratiopharm® 100 mg Retardtabletten	Bruchkerbe	Nein	Nein	
Triamteren comp.-ratiopharm® 50 mg/25 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Trimipramin-ratiopharm® 25 mg Tabletten	Nein	Ja	Ja	
Trimipramin-ratiopharm® 100 mg Tabletten	Kreuzbruchkerbe	Ja	Ja	
Valganciclovir-ratiopharm® 450 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Valproinsäure-ratiopharm® Filmtabletten 150, 300; 600	Nein	Nein	Nein	)

### Suspendierbar

- Hierunter wird verstanden, dass die ungeteilte Arzneiform in kaltem Leitungswasser innerhalb einer gewissen Toleranzzeit zerfällt.  
Bei Kapseln bezieht sich die Angabe auf das Suspendieren des Kapselinhalts.
- „Ja“ Kapseln können geöffnet werden; Retardpellets / Mikrotabletten nicht zerkleinern, sonst wird die Formulierung zerstört!
- „Nein“ Suspendierung ist nicht möglich.
- Da keine Untersuchungen zur Stabilität vorliegen, sollte eine Applikation bei geteilten bzw. gemörserten Tabletten möglichst zeitnah ( $\leq \frac{1}{2}$  Std.) erfolgen; Gleiches gilt für Suspensionen durch aufgeschlammte Pulver.

Stand Mai 2022

Präparat	Teilbar	Mörserbar	Suspendierbar	Hinweis
Valproat-ratiopharm® chrono Retardtabletten 300 mg; 500 mg	Bruchkerbe	Nein	Nein	Für Sondengabe steht Valproinsäure-ratiopharm® Lösung zur Verfügung
Valsartan-ratiopharm® Filmtabletten 80 mg; 120 mg; 160 mg; 320 mg	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Valsartan-ratiopharm® comp. Filmtabletten 160 mg/12,5 mg;	Nein	Ja	Ja	
Valsartan-ratiopharm® comp. Filmtabletten 120 mg/12,5 mg	Bruchkerbe	Ja	Ja	
VENENTABS-ratiopharm® Retardtabletten	Nein	Nein	Nein	
Venlafaxin-ratiopharm® 37,5 mg Hartkapseln, retardiert	Nein	Nein	Nein	Kapsel enthält 1 Tablette à 6,0 x 6,3 mm* Diese kann aus der Kapsel genommen und separat geschluckt werden
Venlafaxin-ratiopharm® 75 mg Hartkapseln, retardiert	Nein	Nein	Nein	Kapsel enthält 2 Tabletten à 6,0 x 6,3 mm* Diese können aus der Kapsel genommen und separat geschluckt werden
Venlafaxin-ratiopharm® 150 mg Hartkapseln, retardiert	Nein	Nein	Nein	Kapsel enthält 3 Tabletten à 6,8 x 6,9 mm* Diese können aus der Kapsel genommen und separat geschluckt werden
Venlafaxin-ratiopharm® 37,5 mg; 75 mg; 150 mg; 225 mg Retardtabletten	Nein	Nein	Nein	
Verapamil-ratiopharm® N 40; 120 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Verapamil-ratiopharm® N 80 Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Verapamil-ratiopharm® 240 mg Retardtabletten	Bruchkerbe	Nein	Nein	
Vitamin-B <sub>1</sub> -ratiopharm® 200 mg Tabletten	Kreuzbruchkerbe	Ja	Ja	
Vitamin-B <sub>6</sub> -ratiopharm® 40 mg Filmtabletten	Kreuzbruchkerbe (Snap-Tab)	Ja	Ja	
Vitamin-B <sub>12</sub> -ratiopharm® 10 µg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
VITAMIN B-KOMPLEX-ratiopharm®	Nein	Nein	Ja*	Pulver
VITAMIN C-ratiopharm® retard 500 mg Hartkapseln, retardiert	Nein	Nein	Ja*	Pellets ca. 1 mm Sondengabe bei entspr. Sondendurchmesser möglich
Voriconazol-ratiopharm® 50 mg; 200 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Weißdorn-ratiopharm® Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	Zerfällt nicht, vorher sorgfältig mörsern
Xipamid-ratiopharm® 10 mg Tabletten	Nein	Ja	Ja	
Xipamid-ratiopharm® 20 mg; 40 mg Tabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	

## Suspendierbar

- Hierunter wird verstanden, dass die ungeteilte Arzneiform in kaltem Leitungswasser innerhalb einer gewissen Toleranzzeit zerfällt.  
Bei Kapseln bezieht sich die Angabe auf das Suspendieren des Kapselinhalts.
- „Ja“ Kapseln können geöffnet werden; Retardpellets / Mikrotabletten nicht zerkleinern, sonst wird die Formulierung zerstört
- „Nein“ Suspendierung ist nicht möglich.
- Da keine Untersuchungen zur Stabilität vorliegen, sollte eine Applikation bei geteilten bzw. gemörserten Tabletten möglichst zeitnah ( $\leq \frac{1}{2}$  Std.) erfolgen; Gleiches gilt für Suspensionen durch aufgeschlammte Pulver.

Stand Mai 2022

Präparat	Teilbar	Mörserbar	Suspendierbar	Hinweis
Zink-ratiopharm® 25 mg Brausetabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	Sondengabe möglich nach Ende des Sprudelvorgangs
Zolmitriptan-ratiopharm® 2,5 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Zolmitriptan-ratiopharm® 5 mg Schmelztabletten	Nein	Ja	Ja	
Zolpidem-ratiopharm® 5 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	
Zolpidem-ratiopharm® 10 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	
Zonisamid-ratiopharm® Hartkapseln 25 mg; 50 mg; 100 mg	Nein	Nein	Ja*	Pulver
Zopiclon-ratiopharm® 3,75 mg Filmtabletten	Nein	Ja	Ja	Suspension frisch herstellen und zeitnah verwenden (temperatur- und lichtempfindlich)!
Zopiclon-ratiopharm® 7,5 mg Filmtabletten	Bruchkerbe	Ja	Ja	Suspension frisch herstellen und zeitnah verwenden (temperatur- und lichtempfindlich)!

## **Bitte beachten:**

Wir machen darauf aufmerksam, dass durch unzulässige Zerkleinerung und Suspendierung von Darreichungsformen die Bioverfügbarkeit und Stabilität zum Teil erheblich verändert werden können.

Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass keine Untersuchungen zu einem eventuellen Wirkverlust durch Adhäsion an Sondenmaterial durchgeführt wurden. Diese Gefahr ist jedoch - von wenigen bekannten Ausnahmen abgesehen - als gering einzustufen.

Grundlage der Applikation per Ernährungssonde sind die Richtlinien zur Sondengabe, die Sie auf den Seiten der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin e.V. ([www.dgem.de](http://www.dgem.de)) einsehen können.

Beim Umgang mit Hormonen /Hormonantagonisten sind besondere Arbeitsschutzmaßnahmen zu beachten (z.B. Handschuhe, kein Einatmen beim Zermörsern, gründliches Reinigen benutzter Gefäße <sup>[\*\*]</sup>)

Bei Verarbeitung von karzinogenen, mutagenen bzw. reproduktionstoxischen Substanzen (inkl. Zytostatika, Hormonen und Hormonantagonisten) sind durch das Personal - insbesondere bei Frauen im gebärfähigen Alter - geeignete Arbeitsschutzmaßnahmen zu ergreifen (z. B. Handschuhe, kein Einatmen beim Mörsern, gründliches Reinigen benutzter Gefäße).

Für Rückfragen erreichen Sie uns über die kostenlose Telefon-Nr. 0800 800 5022

Ihre Abteilung Medizin und Wissenschaft

## **Suspendierbar**

- Hierunter wird verstanden, dass die ungeteilte Arzneiform in kaltem Leitungswasser innerhalb einer gewissen Toleranzzeit zerfällt. Bei Kapseln bezieht sich die Angabe auf das Suspendieren des Kapselinhalts.
- „Ja“ Kapseln können geöffnet werden; Retardpellets / Mikrotabletten nicht zerkleinern, sonst wird die Formulierung zerstört!
- „Nein“ Suspendierung ist nicht möglich.
- Da keine Untersuchungen zur Stabilität vorliegen, sollte eine Applikation bei geteilten bzw. gemörserten Tabletten möglichst zeitnah ( $\leq \frac{1}{2}$  Std.) erfolgen; Gleiches gilt für Suspensionen durch aufgeschlammte Pulver.